

膿囊十數個ヲ有シ内容透明ニシテ極テ粘稠「ゲラチン」

# ◎鎖骨下動脈結紮ノ一實驗

會員 池 龜 祐 藏

鎖骨下動脈ノ結紮ヲ要スルハ腋下動脈、無名動脈、大動脈等ノ動脈瘤及其近部ノ諸種ノ出血ノ如キ場合ニシテ其手術ノ困難、場況ノ危險ナルヲ以テ此ヲ行フヲ甚タ多カラス我醫學部ニ於テモ實ニ今回ナ以テ初陣トス聊カ記シテ同臭ニ報ス

西川某十一歳ノ男兒七月廿七日午後一時頃高サ三間計リノ樹枝上ヨリ間凸不平ノ竹木繁茂セル溪間ニ墜落シ左第貳掌骨基底背側脫臼、左手掌ニ背側マテ穿孔セル刺傷、右鎖骨上窩胸鎖乳頭筋ノ外縁ヨリ深サ四仙迷計リノ鎖骨下ニ向フ所ノ刺創アリテ指探ニ由テ長サ一仙

迷ノ竹片ヲ出ス出血多カラス熱三十七度七分脈九十五至肺等貴要需管ニ異常ヲ認メサルヲ以テ一般ノ所置ヲ施シ入院セシメタリシニ同夜右腋下ヨリ胸壁ニ至ル迄腫起シ疼痛アリ○廿八日熱三十八度八分脈百五至甘汞頓服及冷罨法ニ由テ疼痛少シク輕快スルモ手掌ノ創ハ蓄膿腫起シ○廿九日熱三十九度二分脈百十至水曹ヲ投ス○卅日熱三十九度一分脈百二十至手掌ノ腫起減退セス之ニ觸ルレハ中ニ異物ノ存スルカ如シ背側ヲ切開セシニ長サ一寸以内ナル十二三個ノ竹片及一條ノ藁ヲ出セリ○三十一日熱三十八度六分脈百二至○八月一日熱三十七度五分脈百至便秘腹痛アルノ外異常ナシ○二日熱三十八度六分脈百十至右腋下疼痛再ヒ増劇ス兼テ便秘アルヲ以テ甘汞ヲ投ス○三日熱三十八度一分脈百五至腋下ヨリ鎖骨上下窩ニ腫起シ○四日熱三十八度脈百五至腋下ノ腫起益増加シ下垂蓄膿スルヲ認ム故ニ大覺

## (論説及實驗) 鎖骨下動脈結紮ノ一實驗

三百九十六

筋下縁ニ於テ切開シ消息子ヲ送入スルニ鎖骨下ヲ通シ鎖骨上窩ノ創口ニ通ス異物等ニ觸レス同夜熱三十七度脈八十五至〇五日午後三時熱發三十九度八分水曹ヲ投ス〇七日熱三十七度四分脈九十至其他異常ナシ〇八日熱三十七度脈八十至午前十時半頃平生ノ如ク創面洗滌ニ臨ミ綳帶ヲ去ルヤ腋下ノ創口ヨリ出血シ其量殆ント五〇〇、〇患者急性貧血ヲ呈シ冷汗淋漓タリ直ニ鎖骨下動脈ヲ壓シテ一時止血ス而シテ創口ヲ開大セサレハ確知シ難キモ零ホ腋下動脈ノ出血ナルヲ想像シタリ然レハ患者ノ狀態不良ナレハ今陳舊ノ創口ヲ開大シテ該動脈ヲ探求セシカ爲メ濫リニ時間ヲ費シ目前ニ危險ヲ加ヘンヨリハ寧ロ新創面ヲ作り鎖骨下動脈ヲ結紮スルノ確實ナルニ如カスト決意シ即チ第三部ノ結紮ヲ行フ先ツ患側ノ肩胛ヲ舉上シ烏喙突起ヨリ鎖骨外半部ニ並行シ殆ント七仙迷ノ切開ヲ施シ「モーレンハイム」氏三

角ニ至リ三角筋ハ之ヲ牽排シ大胸筋上縁ノ一部ヲ切り深ク進ミ頭靜脈ハ之ヲ外上方ニ壓排シ外腎壁動脈ヲ結紮シ肩峰鎖骨筋鞘ヲ分離シ鎖骨下筋ノ一部ヲ切り深ク入レハ鎖骨下靜脈ヲ見ル之ニ二條ノ結紮系ヲ送り上下ニ二仙迷ヲ距テ、結紮シ尙未稍部ノ動脈搏動ノ止ムヲ確ノ決然兩斷ス結紮系及靜脈ニ送りタル糸ハ之ヲ切斷セスシテ創口ニ納ム茲ニ於テ尙ホ下方ヲ切開シ出血セル部ノ景況ヲ窺ハント欲スレハ患者ノ狀態危險ナルヲ以テ茲ニ手術ヲ終ル以上述ムル所ヲ以テ見ルニ外傷ノ際腋下動脈壁損傷ヲ受ケ一時結痂ニ由テ止血セシモノ創内ノ膿膿ト共ニ軟解シ以テ出血ヲ來スニ至リタル者ノ如シ同夜熱三十七度脈百三十至精神異常ナク一般疲勞スルカ如キノミ赤酒ヲ與フ〇九日熱三十八度八分脈百至患側上肢昨夜迄厥冷セシモ今朝ヨリ少シク温暖トナル上

膊脈搏ナシ知覺運動共半麻 痺 ナリ○十日熱三十九度脈

百至患肢稍暖カナリ創 頭 清潔ナリ便通ナシ○十一日熱

三十七度四分脈百十五至爪甲赤色ナキカ如キモ壓スレ

ハ少シク變色ス脈搏ナシ知覺麻痺ナシ運動ハ肘關節迄

ニシテ手腕關節以下殆ント不動ナリ便秘止マス甘汞ヲ

與フ○十二日熱三十八度脈九十至諸症前日ノ如シ便通

二行○十三日熱三十七度五分脈百至創傷異常ナク食欲

振起ス○十四日熱三十七度八分脈九十八至ナリ爾後諸

症異常ナク患者体力日ニ恢復シ患肢ハ唯手腕關節以下

運動不全ナルノミ脈搏ハ未タ全ク觸レス○二十一日再

生ノ恩ヲ謝シ欣然院ヲ辭シテ去ル

# 剖檢記事

乳癌

木町

一、一

檢

二

三

一

沒

失

ラ

、ル